



BITUUMENIPÕLETUSED

TEABELEHT ESMAABI ANDMISEKS JA MEDITSIINITÖÖTAJATELE

Kõik kuuma bituumeniga töötavad isikud peavad neid soovitusi tundma, et anda põletusohvritele esmaabi.

See dokument peab olema patsiendiga kaasas ja asetatud nähtavale kohale enne patsiendi viimist arsti juurde või haiglasse.

ESMAABI

Bituumenipõletusi tuleb jahutada vähemalt 20 minutit. Valu leevendamiseks alustada jahutamist leige veega, seejärel jätkata alajahtumise vältimiseks sooja veega, kui põletatud pind on labakäest suurem. Silmapõletusi tuleb veega niisutada vähemalt 5 minutit.

**BITUUMENIT EI TOHI PÜÜDA
PÕLETUSKOHALT EEMALDADA**

ARSTIABI

(kahtluste korral võtta kohe ühendust põletuskeskusega)

Bituumenikihi nahalt eemaldamiseks tuleb tegutseda arsti juhendamisel või haiglas võimalikult kiiresti. Selle juures tuleb olla ettevaatlik, sest ettevaatamatus bituumeni eemaldamisel võib põhjustada uusi nahakahjustusi, millega kaasneb oht infektsiooni ja komplikatsioonide tekkimiseks.

Alguses ei ole oluline teada, kas põletus on pindmine või sügav. Esmatähtis on bituumen eemaldada uusi kahjustusi tekitamata.



BITUUMENIPÕLETUSED

AINULT MEDITSIIINIPERSONAL: PÕLENUD NAHAPINNALE KLEEPUNUD BITUUMENI EEMALDAMINE

Soovitavad on mitmesugused meetodid:

- Bituumenikiht tuleb jätta põletuskohale ja katta see paksu parafiini sisaldava marlisidemega või parafiinipõhise antibiootikumsalviga, nt Flammazine (hõbesulfadiasiin). Selle mõjul bituumen pehmeneb ja seda on võimalik mõni päev hiljem ettevaatlikult eemaldada.
- Teise võimalusena kantakse põletuskohale oliiviõli (kasutamata pudelist) ja lastakse sellel mõni tund mõjuda. Seejärel saab bituumeni ettevaatlikult marlipadjaga hõõrudes eemaldada. Bituumenijääkide eemaldamiseks seotakse kahjustatud kohtade ümber oliiviõliga immutatud marlside. Sidet vahetatakse iga nelja tunni järel. 24 tunni möödumisel saab bituumenijäägid eemaldada, põletuskoha desinfitseerida ja tavapäraselt ravida.

KOGU JÄSET ÜMBRITSEVAD ŽGUTIEFEKTIGA PÕLETUSED

Kui bituumen ümbritseb jäset või muud kehaosa täielikult, võib jahtunud ja kõvenenud bituumen tekitada ödeemi (turse) tõttu põletuskohas žgutiefekti. Sel juhul tuleb bituumen võimalikult kiiresti pehmenendada ja/või tükkidena eemaldada, et see ei takistaks vereringet.

SILMAPÕLETUSED

Bituumenit ei tohi püüda eemaldada meditsiinilise väljaõppeta isik. Patsient tuleb diagnoosimiseks ja asjakohase ravi saamiseks viivitamatult suunata silmaarsti juurde või haigla silmaosakonda.

Eurobitume has made considerable efforts to compile this publication on the basis of reliable sources. More specifically this publication was established with the assistance of Professor Stan Monstrey, Head of Burns Unit of the Academy Hospital of Ghent (Belgium) and Jean-Pierre Arnould, Chief Executive officer of the Belgian Burns Foundation and reflects the prevailing opinions in medicine on Eurobitume would like to thank Professor Stan Monstrey and Jean-Pierre Arnould for their contribution in compiling this guide.

By consulting and/or using this publication, the user acknowledges and agrees to be bound by the following stipulations. Eurobitume has made considerable efforts to compile this publication on the basis of reliable sources. However, Eurobitume cannot and does not guarantee the completeness, accuracy, reliability and effectiveness of the information contained in this publication for whatever purpose. Furthermore, the content of this publication may be changed, suspended, revised and/or removed by Eurobitume, at its sole discretion, at any time for whatever reason and without notice. Finally, except for cases of fraud, neither Eurobitume nor its members are liable for any loss, damages or injury whatsoever relating to the consultation or use of this publication, or the inability to do so.

Eurobitume, September 2022, info@eurobitume.eu

ISBN: 978-2-930160-73-3

D/2022/7512/104



eurobitume

european bitumen association
info@eurobitume.eu